

ABSTRAK

Latar Belakang: Bunuh diri adalah suatu masalah global dalam bidang kesehatan jiwa masyarakat. Menurut kongres dunia *International Association of Suicide Prevention* 2016, salah satu strategi untuk mencegah bunuh diri adalah dengan menggunakan metode skrining risiko bunuh diri di masyarakat. *Sheehan-Suicidality Tracking Scale (S-STTS)* telah dikembangkan sebagai salah satu instrumen untuk menilai risiko bunuh diri namun belum banyak digunakan ataupun teruji validitas dan reliabilitasnya seperti BSSI (*Beck Scale for Suicidal Ideation*), termasuk di Indonesia.

Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis validitas dan reliabilitas S-STTS dengan BSSI sebagai *gold standard* pada populasi umum di Surabaya

Metode Penelitian: Penelitian deskriptif observasional dengan desain *cross sectional* pada 300 responden di populasi umum Surabaya pada bulan April 2018. Kriteria inklusi laki-laki dan perempuan berusia 21-60 tahun, pendidikan minimal lulus SMA, bersedia mengikuti penelitian.

Hasil Penelitian: S-STTS adalah instrumen yang valid ($AUC=0.982$, sensitivitas 100%, spesifisitas 96,32%) dan reliabel ($cronbach's\ alpha = 0.9802$) untuk mendeteksi risiko bunuh diri pada populasi umum di Surabaya. Dari total 300 sampel, terdapat 28 yang positif berisiko bunuh diri baik dengan BSSI maupun S-STTS.

Simpulan: S-STTS adalah instrumen yang valid dan reliabel untuk mendeteksi risiko bunuh diri pada populasi umum di Surabaya.

Kata Kunci: risiko bunuh diri, S-STTS, BSSI